

20% des enfants de moins de 6 ans sont atteints d'une anomalie visuelle

La vision n'est pas acquise à la naissance. Elle ne se développe que si on l'utilise...

80% des informations reçues par le cerveau sont traitées par la vision

Parlez-en à votre médecin, il vous conseillera un orthoptiste.

Le bilan orthoptique dépiste et il complète une consultation ophtalmologique.



© P'titMip

Réalisation : le groupe de travail P'titMip des orthoptistes et le Dr Alberge
Illustrations : Anne Fioc
Création graphique : Emilie Cabarrou

Réseau P'titMip

Hôpital Paule de Viguier
Unité Inserm UMR 1027
330 av. de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 TOULOUSE cedex 9
www.ptitmip.fr



Vers un développement harmonieux :
l'importance de la vision

Dépistage de la vision
chez l'orthoptiste



© P'titMip

AGES CLÉS :

9 MOIS

2 ANS

5 ANS

9 MOIS

Signes d'alerte visuels ou autres :

- Votre bébé louche
- Ses yeux ont des secousses
- Il ne s'intéresse pas à l'entourage
- Il ne cligne pas à la lumière forte ou à la menace
- Il ne fixe pas
- Il ne sourit pas
- Il ne regarde que d'un côté
- Il larmoie, a les yeux rouges



L'examen doit être systématique :


- Si votre bébé a eu une complication à la naissance (prématurité, petit poids,...)
 - En cas d'antécédents de lunettes ou strabisme dans la famille.

Pourquoi si tôt?

- La communication se fait par le regard
- Une bonne vision favorise le développement global de l'enfant et facilite ses apprentissages
- La prise en charge est plus efficace lorsqu'elle est précoce. L'efficacité du traitement est maximale si la prise en charge est faite avant 3 ans

Examen de l'orthoptiste

- Communication visuelle
- Orientation du regard
- Strabisme ?
- Vision des reliefs ?
- Mesure de l'acuité visuelle : recherche d'un défaut optique et d'une amblyopie (oeil faible)



© P'titpip

2 ANS

- Mêmes signes d'alerte qu'à 9 mois
- Votre enfant se cogne, tombe fréquemment, butte sur les trottoirs ou les marches d'escalier
- Il plisse les yeux, grimace
- Il ferme un oeil (photophobie)
- Il se rapproche pour dessiner, regarder les livres ou les écrans

5 ANS

- Mêmes signes d'alerte qu'à 2 ans
- Ses yeux picotent, brûlent
- Il voit flou
- Il voit double
- Il a des maux de tête
- Il confond certains chiffres ou certaines lettres
- Il a des difficultés d'attention
- Il a des troubles d'apprentissage